



ÉVOLUTION DE LA RÉPONSE SEXUELLE EN FONCTION DE L'ÂGE

selon MASTERS ET JOHNSON

	JEUNES HOMMES	HOMMES ÂGÉS
MAMELONS	- érection du mamelon	• diminution de la réponse
MYOTONIE	- tension musculaire accrue ; contractions musculaires involontaires	• diminution possible de la réponse
RECTUM	- contractions du sphincter rectal au cours de l'orgasme	• diminution de la fréquence
PÉNIS	- érection au bout de 3 à 5 secondes de stimulation, érection complète tôt dans le cycle. - maîtrise éjaculatoire variable - peut obtenir et perdre partiellement l'érection complète plusieurs fois au cours du cycle - coloration du gland du pénis - éjaculation puissante ; contractions d'expulsion au cours de l'orgasme - phase de réfraction variable	• à partir de 50 ans, délai 2 ou 3 fois plus long ; l'érection n'est complète qu'immédiatement avant l'orgasme. • érection soutenue plus longtemps sans éjaculation • difficulté de recouvrer une érection complète à la suite d'une perte partielle • diminution ou absence • affaiblissement, diminution possible de la sensation • après l'orgasme, phase de réfraction prolongée ; détumescence rapide du pénis
ÉJACULATION	- en deux étapes, selon un processus bien différencié - contractions prostatiques - conscience de la pression et de l'émission du fluide	• expulsion du liquide séminal en une seule étape • inaperçue par l'observation clinique • écoulement plutôt qu'expulsion chez certains sujets ; spermatozoïdes moins viables et moins nombreux que chez les hommes plus jeunes
SCROTUM	- effacement du plissement du scrotum sous l'effet de la tension sexuelle	• diminution de la réponse
TESTICULES	- élévation testiculaire vers la fin de l'excitation ou au début du plateau, augmentation de volume - abaissement des testicules lors de la résolution	• diminution de la réponse • abaissement rapide

Source : Mishara et Riedel, Le vieillissement - Editique : Dr Mias - Equipe Soignante Long Séjour- CH Mazamet